

ПОЛЕН АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА У ВАЗДУХУ

Месечни извештај за Ниш и околину: Јул 2014.год.

На неопходност мониторинга полена суспендованог у ваздуху указала је Светска здравствена организација (WHO) званичним закључцима састанка на тему „Phenology and Human Health:Aergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003.год. WHO потврђује да је аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година а резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање, па и лечење поленских алергија.

У Србији на основу Закона о заштити животне средине , члан 3 тачка 11, полен је окарактерисан као загађивач емитован из природе због, пре свега, негативног и штетног утицаја на здравље људи.

Начин да се помогне особама алергичним на полен , који је препоручен од стране WHO је организовање и спровођење континуираног мерења концентрације полена у ваздуху.

Полен биљака је за человека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) изазивају алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Загађеност ваздуха у урбаним, индустријским срединама доприносе појачаном алергијском дејству аерополена. Светска здравствена организација је упозорила да ће различите врсте алергијских реакција код људи бити болест савременог човечанства у 21. веку.

Негативан утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у "природне" загађиваче ваздуха. Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и врсте аераалергеног полена, како би се стање пратило и издавало путем извештаја о стању полена, прогноза за наредни период, као и формирање календара полена. Ови подаци су

намењени: превенцији код сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама, побољшању рада комуналних и урбанистичких служби на уништавању трава и корова које су узрочници алергијских болести, бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању у међународну сарадњу, јер су проблеми аерополена не само локалног, регионалног него и глобалног карактера.

Мерење концентрације полена 24 алергене биљне врсте у ваздуху обавља се у оквиру систематског праћења концентрације полена на територији града Ниша, у оквиру државне мреже за мониторинг алергеног полена који врши Агенција за заштиту животне средине.

Вредности концентрације полена у ваздуху мере се на висини 15m изнад површине тла. Временски период континуираног узимања узорака почиње почетком фебруара и траје до првих новембарских дана, мада у зависности од временских услова овај интервал може да варира.

Границна вредност за све алергене биљке изузев амброзије је 30 поленових зрна /m³ ваздуха, а за амброзију 15 поленових зрна /m³ ваздуха.

На основу резултата обављених испитивања може се констатовати следеће:

Мерење концентрације поленових зрна у ваздуху на територији града Ниша у 2014-ој години почело је 10.2.2014. године.

У јулу месецу био је актуелан аерополен следећег дрвећа, трава и корова:

Борови: Полинација борова у овом периоду је трајала 14 дана и била је у оквиру граничних вредности.

Липа: Полинација липе у овом периоду је трајала 21 дана, а концентрација овог полена у ваздуху је била у оквиру граничних вредности.

Траве: Полинација трава у овом периоду је трајала 31 дан, а концентрација овог полена у ваздуху је 8 дана прелазила граничне вредности. Највиша концентрација полена постигнута је 7.7. 2014. године и износила ја 90 поленових зрна/ m³ ваздуха.

Коприва: Полинација коприва у овом периоду је трајала 31 дан, а концентрација овог полена у ваздуху је 23 дана прелазила граничне вредности. Највиша концентрација полена постигнута је 25.7.2014. године и износила ја 137 поленових зрна/ m³ ваздуха.

Боквица: Полинација боквице у овом периоду је трајала 31 дана и била је у граничним вредностима.

Амброзија: Полинација амброзије у овом периоду је трајала 13 дана и била је у граничним вредностима.

Пепељуге и штиреви: Полинација пепељуга и штирева у овом периоду је трајала 22 дана и била је у граничним вредностима.

Конопља: Полинација конопље у овом периоду је трајала 4 дана и била је у граничним вредностима.

Пелин: Полинација конопље у овом периоду је трајала 22 дана и била је у граничним вредностима.

Киселица: Полинација киселице у овом периоду је трајала 11 дана и била је у граничним вредностима.

Тује и чемпреси: Полинација туја и чемпреса у овом периоду је трајала 2 дана и била је у граничним вредностима.

За јул месец издвајамо алергени полен коприве (137 поленових зрна/ m³ ваздуха) и трава (90 поленових зрна/ m³ ваздуха), који у унакрсним реакцијама са другим присутним поленима погоршавају клиничку слику алергичних особа.

Тим сертификованих лица ИЗЈЗ Ниш

за мониторинг, праћење стања и прогнозу аерополена:

Богојевић Зоран

Станковић Немања

